



## Clivia (Kliwia)

rodzina Amaryllidaceae (Amarylkowate)



W rodzaju kliwia jest 6 gatunków roślin, które pochodzą z Afryki Południowej. Jest rośliną cebulową, która okresowo podczas pory suchej gubi liście. W tym czasie wewnątrz cebuli kształtują się pąki kwiatowe na rok przyszły. W naturalnym stanowisku rośnie w miejscach wilgotnych i cienistych. W Polsce ze względu na duże i barwne kwiaty powszechnie uprawiane są dwa gatunki, jako rośliny ozdobne w pomieszczeniach - *Clivia miniata* – kliwia cynobrowa i *clivia nobilis* - kliwia szlachetna.

***Clivia miniata*** - Okazała roślina zimozielona o słabo wykształconej cebuli i silnych korzeniach. Liście ma odziomkowe, ciemnozielone, skórzaste, długie, płaskie i równowąskie. Ułożone są gęsto, dwurzędowo i rozchylają się łukowato na dwie strony. Spomiędzy liści wyrastają baldachowate kwiatostany, znajdujące się na szczycie grubej, mięsistej łodygi kwiatostanowej. Pęd kwiatostanowy jest bezlistny, wyrasta do 80 cm wysokości. Kwiaty w baldachu umieszczone są po 10-20 sztuk; są duże, pomarańczowe, cynobrowo – pomarańczowe lub czerwone z żółtym środkiem. Kliwia kwitnie od II do V. Wymaga jasnego stanowiska, ale bez ostrego słońca. W czasie wegetacji podłoże powinno być zawsze lekko wilgotne, ale nie lubi przelewania. W okresie zimowym roślina powinna być umieszczona w jasnym i chłodnym miejscu (około 12°C) i ograniczamy jej podlewanie. Kliwia nie lubi obracania i zmiany miejsca. Rozmnażamy je przez oddzielenie bocznych pędów. W uprawie na skalę produkcyjną stosuje się rozmnażanie przez wysiew nasion.

***Clivia nobilis*** – bardzo podobna roślina. Liście ma odziomkowe, językowate, półstojące o długości 40-60 cm. Kwiaty w baldachach czerwone, półzwieszane, wąskie i lejkowate.