




## **Vallota speciosa (Walota okazała)**

**rodzina Amaryllidaceae,**

**synonimy: *Cyrtanthus elatus*, *Cyrtanthus purpureus***



Rodzaj obejmuje ponad 50 gatunków, pochodzących głównie z Południowej Afryki, (nieliczne występują w Afryce wschodniej). Można je spotkać w różnych środowiskach - od stale wilgotnych do prawie pustynne. Nazwa *Cyrtanthus* pochodzi z języka greckiego - *kyrtos* - krzywy, wygięty i *anthos* - kwiat.

**Vallota speciosa** - jest to roślina cebulowa należąca do grupy wiecznie zielonych. Liście są wąskie (ok. 2 cm szerokości), długie (25 a nawet 40 cm), mięsiste, ciemnozielone, z woskowym nalotem, opadające na końcach. Kwitnie wiosną, latem. Pęd kwiatostanowy dość gruby, dorasta do 50 cm długości, a po przekwitnieniu powoli zamiera. Z dużej cebuli może wyrastać nawet kilka pędów. Kwiaty typowe są jasnoczerwone z dość długimi żółtymi pylnikami, lecz u form botanicznych mogą być białe, łososiowe, kremowe i różowe. Kwiaty są duże o średnicy do 10 cm, lejkowate i szeroko rozwarte, złożone z 6 zaokrąglonych na końcach płatków. Na pędzie kwiatostanowym może wyrastać od 2 do 6 kwiatów. W warunkach uprawy domowej raczej nie zawiązuje nasion.

Wymaga stanowiska jasnego, o żyznym, próchnicznym, dobrze zdrenowanym podłożu i o odczynie obojętnym. Podlewanie umiarkowane w okresie wegetacji, (gdy podłoże prawie zupełnie wyschnie), a w okresie spoczynku bardzo skąpe. Nawożenie w okresie wegetacyjnym mniej więcej raz w tygodniu. Roślina wrażliwa na mróz i w naszych warunkach uprawiana, jako ozdobna roślina doniczkowa. Zimą wymaga okresu spoczynku - obniżamy temperaturę, (lecz powyżej 6 stopni C) i ograniczamy podlewanie. Przesadzamy raz na kilka lat (4-6) zwracając uwagę, aby cebula wystawała ponad ziemię. Są uprawiane także na kwiat cięty - dość duża trwałość kwiatów w wazonie. Rozmnażamy je z cebulek przybyszowych.